

Le laboratoire

Le Laboratoire d'Analyses de Surveillance et d'Expertise de la Marine (LASEM) de Cherbourg réalise des analyses chimiques et radiologiques au profit des formations de la Marine nationale dans l'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord. Dans le cadre de la surveillance radiologique, le LASEM effectue plus de 2500 prélèvements d'échantillons dans les milieux atmosphérique, terrestre et maritime, auxquels s'ajoutent les mesures en continu de l'ambiance radiologique par le 2SNM (Système de Surveillance Nucléaire de la Marine).



PORT MILITAIRE DE CHERBOURG

Surveillance de l'environnement

Résultats du 2ème semestre 2023

Une expertise reconnue

Pour effectuer la surveillance radiologique de l'environnement, ce laboratoire détient les agréments nécessaires délivrés par l'autorité de sûreté nucléaire.

Le LASEM de Cherbourg est également accrédité Cofrac (Comité français d'accréditation) dans de nombreux domaines.




Retrouvez cette plaquette avec des explications détaillées sur www.defense.gouv.fr/marine

rubrique "enjeux/environnement/limite de l'impact environnemental/la surveillance radiologique"

Le saviez-vous ?

Exemples de sources d'exposition sur l'homme



Pour tous renseignements

BCRM Cherbourg
Commandement de l'arrondissement maritime
de la Manche et de la mer du Nord - CC01
50 115 - Cherbourg-en-Cotentin CEDEX
02 33 92 65 09

Informations complémentaires



Réseau national de la radioactivité de l'environnement
www.mesure-radioactivite.fr



Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
www.irsn.fr



Préfecture de la Manche
www.manche.gouv.fr

Pour vérifier l'absence d'impact de nos activités sur l'environnement, une surveillance systématique et continue de la radioactivité est assurée.

LES MESURES DANS L'ENVIRONNEMENT

Le port militaire de Cherbourg accueille des bâtiments à propulsion nucléaire, dont le soutien et l'entretien s'effectuent dans deux installations nucléaires de base secrète (INBS) exploitées par la direction générale de l'armement (DGA).

Pour contrôler l'absence d'impact de leurs activités sur l'environnement, notre laboratoire effectue chaque année plus de 2500 prélèvements sur différents points des milieux terrestre, atmosphérique et marin sur le site et dans son environnement. En découlent plus de 6000 mesures.



SURVEILLANCE ATMOSPHÉRIQUE				
Air	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Débit de dose gamma ambiant (nSv/h)*	69	88	150	87
Activité naturelle (mBq/m ³)	3,4	4,4	5,6	4,9
Activité artificielle (mBq/m ³)	< SD	< SD	< SD	< SD
Eau de pluie	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Activité naturelle (Bq/L)	0,66	0,90	1,12	0,92
Activité artificielle (Bq/L)	< SD	< SD	< SD	< SD

* Le débit de dose gamma ambiant est un paramètre fluctuant, fonction de la nature de l'environnement géographique dans lequel la balise se trouve. Les valeurs habituellement mesurées sont de l'ordre du bruit de fond naturel ambiant. Ce débit est un indicateur fiable car serait amené à augmenter en cas d'événement radiologique anormal.

Seuil de décision (SD)

C'est une limite métrologique en dessous de laquelle la présence d'émetteurs radioactifs ne peut pas être confirmée. Ainsi, si les valeurs mesurées sont inférieures au seuil de décision, on considère que l'élément radioactif est absent de l'échantillon. C'est un indicateur de performance de la mesure, dont les ordres de grandeur moyens pour notre laboratoire sont donnés ci-dessous :

- pour l'air (aérosols sur filtre) : 0,001 mBq/m³ ;
- pour l'eau de rivière : 0,3 mBq/L ;
- pour les sédiments : 0,2 Bq/kg (sec) ;
- pour le lait : 30 mBq/l.
- pour l'eau de pluie : 0,2 à 2 Bq/L ;
- pour l'eau de mer : 0,3 mBq/L ;
- pour la faune, la flore : 0,05 Bq/kg

Lorsque le résultat est indiqué < XX, le nombre indiqué correspond à la moyenne des valeurs significativement différentes du SD

SURVEILLANCE TERRESTRE				
Eau douce (Rivière - La Divette)	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Activité naturelle (mBq/l)	< SD	<7,2	21,4	6,0
Activité artificielle (mBq/l)	< SD	< 0,2	0,4	< 0,1
Lait (Vache)	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Activité naturelle (mBq/l)	43059	43537	44464	44023
Activité artificielle (mBq/l)	< SD	< SD	< SD	< SD
Végétaux spontanés (Ajoncs, conifère)	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Activité naturelle (Bq/kg frais)	84	99	109	96
Activité artificielle (Bq/kg frais)	< SD	< SD	< SD	< 0,01
Légumes (Carotte, choux, laitue, poireau)	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Activité naturelle (Bq/kg frais)	103	118	131	118
Activité artificielle (Bq/kg frais)	< SD	< SD	< SD	< SD

Quelques définitions :

le 2SNM v2

Ce Système de Surveillance Nucléaire de la Marine participe aux trois missions suivantes :

- la surveillance radiologique en continu des sites nucléaires ;
- la gestion d'un évènement à caractère radiologique tel, qu'il entraîne un rejet dans l'environnement ;
- l'entraînement du personnel chargé de la surveillance radiologique et de la gestion de crise.

SURVEILLANCE DU MILIEU MARITIME				
Eau de mer (Querqueville)	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Activité naturelle (mBq/l) (**)	10030	10200	10700	10216
Activité artificielle (mBq/l)	0,9	1,0	1,2	1,2
Algues (Fucus serratus - Saline)	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Activité naturelle (Bq/kg frais)	179	227	273	254
Activité artificielle (Bq/kg frais)	5,3	8,6	13,7	7,0
Mollusques (Patelles - Saline)	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Activité naturelle (Bq/kg frais)	50,0	52,8	55,6	53,0
Activité artificielle (Bq/kg frais)	< SD	< 0,2	1,9	< 0,18
Sédiments (Point 2 - Querqueville)	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Activité naturelle (Bq/kg sec)	374	443	556	429
Activité artificielle (Bq/kg sec)	15,3	18,1	23,5	17,2
Sédiments (Saline)	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Activité naturelle (Bq/kg sec)	261	281	296	285
Activité artificielle (Bq/kg sec)	0,2	0,3	0,4	0,4
Sédiments (Homet)	valeur moyenne du semestre			moyenne annuelle
	Min.	Moy.	Max.	
Activité naturelle (Bq/kg sec)	261	294	317	309
Activité artificielle (Bq/kg sec)	2,9	4,1	5,9	4,3

Il est composé de balises :

- de mesure de débit d'exposition gamma ambiant ;
- de mesure d'activité des gaz rares et d'activité alpha/bêta des aérosols ;
- météorologiques.

Les mesures réalisées sont exportables vers l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), à travers le réseau national de mesure (RNM).

le Becquerel (Bq)

Il s'agit du nombre de désintégrations radioactives se produisant par seconde.

(**) Cette mesure correspond à l'activité du potassium-40, un radioélément naturel présent dans l'eau de mer.